

 - **BASF**

We create chemistry

Delan[®] Pro

Il multisito sistemico
per la vite da vino.

Unico come la tua arte

Delan[®] Pro è una
combinazione unica di
Ditianon e Fosfonato di
potassio che offre elevata
semplicità d'uso, ampio
spettro d'azione ed elevata
affidabilità di risultato anche
nelle condizioni più difficili



Composizione

Ditianon **125 g/l**

Fosfonato di potassio **561 g/l**



Formulazione

Sospensione Concentrata (SC)

Delan® Pro

Il multisito sistemico per la vite da vino

Confezioni: 5L, 10L

I vantaggi per il viticoltore


- Elevata protezione di grappoli e foglie, inclusa la nuova vegetazione in accrescimento
- Elevata affidabilità anche in condizioni climatiche difficili
- Sicurezza del risultato grazie all'azione multisito
- Possibilità di pianificare i trattamenti grazie all'elevata resistenza al dilavamento
- Ampio spettro di azione per una protezione completa del vigneto
- Elevata facilità d'uso



Scheda tecnica

Patogeni	Dose (L/ha)	Epoca d'impiego	Modalità d'impiego	Intervallo di sicurezza (gg)
Escoriosi	3	Da germogliamento a foglie distese	2 trattamenti a 7 giorni	42
Peronospora e Black Rot	3-4	Da foglie distese a invaiatura	4 trattamenti a 10-14 giorni	

Posizionamento consigliato



Escoriosi: da germogliamento, massimo 2 applicazioni a 7 giorni.

Peronospora e Black Rot: applicazioni preventive da foglie distese ogni 10-12 giorni; massimo 4 applicazioni. Utilizzare l'intervallo più breve in caso di forte pressione della malattia o elevato accrescimento fogliare.

La dose di 3 L/ha è adeguata alla maggior parte delle situazioni. In caso di necessità il dosaggio è incrementabile fino a 4 L/ha.

Raccomandazioni e avvertenze: Delan® Pro è generalmente selettivo su vite in ogni fase del ciclo colturale. Su varietà sensibili a Ditleton (es. Corvina, Corvinone, Malvasia, Molinara, Rondinella, Schiava etc.), si consiglia di non eseguire il trattamento nella fase di allegagione/acino pepe (BBCH 71-73).

Nei vigneti in cui si prevedono frequenti lavorazioni manuali, si sconsiglia di effettuare miscele con prodotti a base di zolfo. In ogni caso, rientrare in vigneto dopo 48 ore dal trattamento e indossare i dispositivi di protezione individuale indicati in etichetta.

Delan® Pro: massima efficacia anche con elevatissima pressione

Efficacia % al rilievo del 4 luglio 2016

(calcolata con formula di Abbott sulla severità %)

Peronospora su testimone non trattato

Severità su foglia: 98,1%

Severità su grappoli: 100%

Prova di efficacia:

8 applicazioni dal 22 aprile al 24 giugno

Situazione di elevata piovosità:


340 mm di pioggia nel periodo della prova

Centro di Saggio: Sagea

Località: Campo di Pietra (TV)

Varietà: Glera

% efficacia sui grappoli



Doppio multisito

Nessun rischio di sviluppo resistenza. Utilizzabile per trattamenti ripetuti



Attività preventiva e antispোরulante

Utilizzabile sia per trattamenti preventivi che di soccorso



Ampio spettro

Attivo su Escoriosi, Peronospora e Black Rot



Protezione sistemica completa

Protezione elevata e costante di foglie e grappoli, inclusa la nuova vegetazione



Elevata resistenza al dilavamento

Forte legame con le cere e rapida penetrazione. Non dilavabile dopo un'ora dal trattamento. Resiste fino a 50-60 mm di pioggia



Lunga persistenza di azione

Protezione completa per 10-12 giorni

Coltura	Malattia	Dose L/ha	N° trattamenti	Intervallo di sicurezza
Vite da vino	Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	3	2	42 giorni
	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	3-4	4	
	Black Rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)			
Melo	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	2,5	6	35 giorni
	Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)			
Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia pirina</i>)	2,5	6	35 giorni
	Maculatura bruna (<i>Stemphylium vesicarium spp.</i>)			

BASF Italia
Agricultural Solutions
 Via Marconato, 8
 20811 Cesano Maderno (MB)
 T +39 03625121

www.agro.basf.it
info.agroitalia@basf.com

Scopri di più



Agrofarmaco registrato dal Ministero della Salute. Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze, le frasi ed i simboli di pericolo riportate in essa.