

STROBY WG

Fungicida con protezione di lunga durata
per la difesa di melo, pero, vite e
rosa (serra)
Granuli Idrodispersibili (WG)

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC C3

STROBY WG COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: Kresoxim-methyl puro g 50 Coformulanti q. b. a g 100	
INDICAZIONI DI PERICOLO: Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	
CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.	
BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1	ATTENZIONE
Officina di produzione BASF SE - 67056 Ludwigshafen - Germania	
PRODOTTO FITOSANITARIO Registrazione del Ministero della Sanità n. 9180 del 27.03.1997	
Contenuto netto: g 200; g 500; g 600; kg 1; kg 1,6	
Partita n.:	

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Indossare guanti, protezione oculare e tuta/abbigliamento da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE

STROBY WG è un fungicida di copertura con finalità preventiva appartenente alla famiglia degli analoghi delle strobilurine, il quale risulta particolarmente efficace su importanti malattie delle pomacee (come ad esempio l'oidio secondario del melo e la maculatura bruna del pero) e della vite (oidio), evidenziando una protezione di lunga durata.

Nel caso di trattamenti su pomacee, STROBY WG risulta selettivo per api ed artropodi utili e non determina rugginosità sulle mele. Su vite, invece, STROBY WG è selettivo nei confronti di api ed acari predatori (per es. *Typhlodromus pyri*). STROBY WG non influenza la fermentazione dei mosti e non altera le caratteristiche organolettiche dei vini.

EPOCHES, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Colture	Malattie	Dosi g/hl	Dosi g/ha	Trattamenti annui (numero massimo)	Cadenza d'intervento
Melo Melo cotogno	Ticchiolatura e Oidio	14	200	3	10 - 14
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	14	200	3	10- 14
Vite	Oidio, Marciume nero, Escoriosi	20	200	3	10 - 14
Rosa (serra)	Oidio	30	300	3	10 - 12

Note: impiegare volumi d'acqua adeguati al fine di ottenere una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 1500 l/ha per melo e pero ed a 1000 l/ha per vite in piena vegetazione, fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella; nel caso sia necessario utilizzare volumi d'acqua superiori a 1500 l/ha per melo e pero ed a 1000 l/ha per la vite, fare sempre riferimento alle dosi massime consentite ad ettaro, indicate in tabella.

Impiego su MELO e PERO:

STROBY WG si applica con finalità preventiva nelle epoche e nelle condizioni in cui le colture risultano più suscettibili agli attacchi fungini.

Si consiglia di utilizzare STROBY WG per 3 trattamenti annui e per non più di 2 trattamenti consecutivi; in ogni caso far seguire al blocco di 2 trattamenti con STROBY WG almeno un intervento con prodotti contenenti sostanze attive a diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di usare sempre STROBY WG in miscela o in alternanza con altri fungicidi dotati di diverso meccanismo d'azione. In presenza di forti pressioni delle malattie, condizioni climatiche sfavorevoli (per es. periodi di elevata piovosità) e rapido accrescimento vegetativo adottare l'intervallo fra i trattamenti più breve (10 giorni).

Impiego su VITE:

STROBY WG si applica con finalità preventiva nelle epoche e nelle condizioni in cui la coltura risulta più suscettibile agli attacchi fungini.

Si consiglia di utilizzare STROBY WG per non più di 3 trattamenti annui. Contro l'oidio, si consigliano non più di 2 trattamenti consecutivi con STROBY WG e in alternanza con altri fungicidi dotati di diverso meccanismo d'azione. In presenza di forti pressioni della malattia, di condizioni climatiche sfavorevoli e di rapido accrescimento vegetativo adottare l'intervallo fra i trattamenti più breve (10 giorni). Non applicare il prodotto nei vivai.

Impiego su ROSA (uso in serra):

Applicare STROBY WG al più tardi alla comparsa dei primi sintomi; se necessario ripetere i trattamenti ogni 10-12 giorni.

Non impiegare STROBY WG per più di 3 trattamenti consecutivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.

Riempire la botte di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluzione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Dopo l'applicazione e comunque prima di eseguire trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dell'attrezzatura d'irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente l'attrezzatura in conformità alla norme vigenti.

COMPATIBILITÀ

STROBY WG non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. Mantenere in agitazione la miscela.

FITOTOSSICITA'

STROBY WG può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. **Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta di mele e di pere e 35 giorni prima della raccolta dell'uva.**

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. **Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21/06/2016